

Datos Importantes Sobre



SHINGRIX

(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

¿QUÉ ES SHINGRIX (VACUNA RECOMBINANTE CONTRA ZÓSTER, ADYUVANTE)?

- SHINGRIX es una vacuna aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para la prevención de la culebrilla (shingles, herpes zóster):
 - En adultos de 50 años o más
 - En adultos de 18 años o más que tienen o tendrán un mayor riesgo de tener la culebrilla debido a que se encuentran inmunocomprometidos por una enfermedad o terapia
- SHINGRIX no se usa para prevenir la varicela

¿QUÉ ES LA CULEBRILLA Y CUÁL ES SU CAUSA?

- La culebrilla, o herpes zóster, es una erupción cutánea dolorosa
- El virus que causa la culebrilla es el mismo que causa la varicela. El 99% de las personas de 50 años o más tienen este virus. Cuando la persona se recupera de la varicela, el virus permanece inactivo en el cuerpo. A medida que crecemos, el sistema inmunitario se debilita, lo que aumenta el riesgo de que se reactive el virus y desarrolle culebrilla. 1 de cada 3 personas desarrollará culebrilla en algún momento de su vida

¿CÓMO FUNCIONA SHINGRIX?

- SHINGRIX es una vacuna que refuerza la protección del cuerpo contra la culebrilla (herpes zóster)

¿CÓMO SE ADMINISTRA SHINGRIX?

- SHINGRIX se administra como una serie de vacunas de 2 dosis (0.5 ml cada una, administradas en el músculo de la parte superior del brazo). Es importante completar la serie de 2 dosis
 - En adultos de 50 años o más, la segunda dosis debe administrarse entre 2 y 6 meses después de la primera dosis
 - En adultos de 18 años o más que se encuentran o se encontrarán inmunocomprometidos debido a una enfermedad o medicamentos, y que podrían beneficiarse de un calendario de vacunación más corto, la segunda dosis se puede administrar 1 o 2 meses después

¿QUIÉN NO DEBE RECIBIR SHINGRIX?

- No debes recibir SHINGRIX si eres alérgico a cualquiera de sus ingredientes o si has tenido una reacción alérgica a una dosis previa de SHINGRIX

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

- Se observó un aumento en el riesgo de síndrome de Guillain-Barré (debilidad muscular grave) después de la vacunación con SHINGRIX
- Pueden ocurrir desmayos después de recibir vacunas inyectables, incluida SHINGRIX. Deben tomarse precauciones para evitar caídas y lesiones debidas a un desmayo
- Los efectos secundarios más frecuentes son dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de inyección, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y malestar estomacal
- Más personas experimentaron fiebre y escalofríos cuando SHINGRIX fue administrada con PNEUMOVAX 23

INFORMACIÓN IMPORTANTE ADICIONAL

- SHINGRIX no se estudió en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Infórmale a tu proveedor de servicios de salud si estás embarazada, si estás planeando quedar embarazada o si estás amamantando
- Es posible que la vacunación con SHINGRIX no proteja a todas las personas
- Pregúntale a tu proveedor de servicios de salud sobre los riesgos y beneficios de SHINGRIX. Solo un proveedor de servicios de salud puede decidir si SHINGRIX es lo indicado para ti

¿NECESITAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

- Esta es solo una descripción breve de la información importante
- Para obtener más información sobre SHINGRIX, habla con tu médico, farmacéutico u otro proveedor de servicios de salud
- Visita SHINGRIX.com o llama al 1-800-772-9292 para obtener más información

