

# Bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị khuyến nghị SHINGRIX



**SHINGRIX**  
(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

SHINGRIX là một loại vắc-xin được FDA phê chuẩn để phòng ngừa bệnh zona (giời leo) (nhiễm herpes zoster) ở người lớn từ 50 tuổi trở lên. SHINGRIX không được sử dụng để ngăn ngừa thủy đậu.


50+

Hơn 99% người trưởng thành từ 50 tuổi trở lên đã có virus gây bệnh zona (giời leo) bên trong cơ thể và virus này có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào

Sau 50 tuổi, nguy cơ phát bệnh zona (giời leo) và mắc các biến chứng nghiêm trọng của bệnh này sẽ tăng mạnh. Cứ 1 trong 3 người sẽ phát bệnh zona (giời leo) trong suốt cuộc đời của họ.



Bệnh zona (giời leo) có thể gây đau đớn, phát ban phỏng rộp có thể kéo dài từ 2 đến 4 tuần



Nhiều người mô tả cảm giác khó chịu này như cảm giác đau đớn, nóng rát, châm chích, hoặc cơn đau đột ngột.

90%

Phòng ngừa bệnh Zona (giời leo) với SHINGRIX

Trong các thử nghiệm lâm sàng, SHINGRIX có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa bệnh zona (giời leo) ở người lớn từ 50 tuổi trở lên đã hoàn thành 2 liều tiêm.

\$0

Hiện SHINGRIX gần như đã miễn phí cho tất cả mọi người

Chi phí quý vị cần phải trả là \$0 tại các nhà thuốc dành cho các bệnh nhân có bảo hiểm Medicare Part D, và \$0 cho 95% bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân.

Xem thêm tại [SHINGRIX.com](https://www.shingrix.com) để biết thêm chi tiết.

✓

SHINGRIX bảo vệ. Tiêm SHINGRIX tại nhà thuốc trong khu vực của quý vị ngay hôm nay.



Để đặt lịch hẹn, hãy quét tại đây hoặc truy cập [ScheduleSHINGRIX.com](https://www.scheduleshingrix.com)

## Thông tin an toàn quan trọng

Không tiêm phòng SHINGRIX nếu quý vị bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin hoặc có phản ứng dị ứng với liều SHINGRIX trước đó.

Vui lòng xem trang tiếp theo để biết thêm Thông tin an toàn quan trọng.  
Vui lòng xem phần [Thông tin quan trọng kèm theo về SHINGRIX](#).

GSK

# Câu hỏi thường gặp

## Tại sao tôi lại có nguy cơ mắc bệnh zona (giời leo)?

Bệnh zona (giời leo) là do cùng loại virus gây thủy đậu gây ra. Nếu quý vị đã từng bị thủy đậu, quý vị sẽ còn virus zona trong người và virus này có thể hoạt động lại bất cứ lúc nào.

## Những biến chứng tiềm ẩn của bệnh zona (giời leo) là gì?

Có khoảng 1 trong 10 người mắc bệnh zona (giời leo) bị đau dây thần kinh suy nhược có thể kéo dài hàng tháng hoặc nhiều năm sau khi tình trạng phát ban biến mất. Trong một số trường hợp hiếm gặp, các vấn đề nghiêm trọng về mắt hoặc thính giác có thể diễn ra trong thời gian dài. SHINGRIX không được phê duyệt để ngăn ngừa các biến chứng từ bệnh zona (giời leo).

## Làm sao tôi có thể phòng tránh bệnh zona (giời leo)?

SHINGRIX là loại vắc-xin duy nhất có sẵn ở Mỹ để ngăn ngừa bệnh zona (giời leo). Tiêm phòng có thể không bảo vệ tất cả các cá nhân khỏi bị nhiễm bệnh.

## Tôi cần bao nhiêu liều SHINGRIX để được bảo vệ đầy đủ?

SHINGRIX là một loại vắc-xin 2 liều. Nhận sự bảo vệ đầy đủ của SHINGRIX bằng cách nhận liều thứ hai 2-6 tháng sau liều đầu tiên. Nếu quý vị đã tiêm liều đầu tiên, hãy đăng ký để được nhắc nhở tiêm liều thứ hai tại trang web [SHINGRIXreminder.com](https://www.shingrixreminder.com)

Hãy đặt lịch hẹn tiêm SHINGRIX tại nhà thuốc trong khu vực của quý vị ngay hôm nay bằng cách quét tại đây hoặc truy cập



[ScheduleSHINGRIX.com](https://www.scheduleshingrix.com)

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng bổ sung ở trang trước và [Thông tin quan trọng kèm theo về SHINGRIX](#).

Chúng tôi khuyến khích quý vị báo cáo bất kỳ sự cố bất lợi về vắc-xin cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Truy cập [www.vaers.hhs.gov](https://www.vaers.hhs.gov) để gửi báo cáo hoặc gọi theo số [1-800-822-7967](tel:1-800-822-7967).

## SHINGRIX có được bao gồm trong bảo hiểm của tôi không?

Hầu hết các gói bảo hiểm đều có bao gồm vắc-xin SHINGRIX cho bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Vui lòng kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị về việc tiêm phòng.

## Hiểu được các tác dụng phụ tiềm ẩn

Sau mỗi liều SHINGRIX, quý vị có thể bị đau, đỏ và sưng tại vị trí tiêm. Các tác dụng phụ phổ biến khác bao gồm đau cơ, mệt mỏi, đau đầu, run, sốt, và khó chịu trong bụng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ quan ngại nào.

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng ít phổ biến hơn, nhưng các phản ứng này có thể bao gồm phát ban, sưng mặt hoặc cổ họng, khó thở, nhịp tim nhanh, chóng mặt và mệt mỏi. Nếu quý vị gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, vui lòng tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức.

## Thông tin an toàn quan trọng (tiếp theo)

- Nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barré (yếu cơ nghiêm trọng) tăng sau khi tiêm phòng SHINGRIX.
- Có thể bị ngứa xù sau khi tiêm vắc-xin, bao gồm cả SHINGRIX. Cần phải đề phòng để tránh bị ngứa và thương tích do ngứa xù.
- Các tác dụng phụ phổ biến nhất là bị đau, đỏ và sưng ở chỗ tiêm, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu, run, sốt và khó chịu trong bụng.
- SHINGRIX chưa được nghiên cứu trên phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Vui lòng thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị đang mang thai, dự định mang thai, hoặc đang cho con bú.
- Tiêm phòng bằng SHINGRIX có thể không bảo vệ tất cả các cá nhân khỏi bị nhiễm bệnh.
- Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về các nguy cơ và lợi ích của SHINGRIX. Chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới có thể quyết định xem SHINGRIX có phù hợp với quý vị hay không.